



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS  
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA  
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

S U L T A N I N A  
=====

SUMIDAD.— A. globosa, arañosa, verde pálido. B. casi globosa, arañosa, verde pálido.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.— Desplegadas, haz arañoso, envés lanoso-velloso con regiones bronceadas, verde pálido.

HOJAS JOVENES INFERIORES.— Extendidas, haz glabro, envés velloso, verde.

SARMIENTO HERBACEO.— Sección transversal circular, contorno liso, enteramente glabro, enteramente verde.

ZARCILLO.— Intermitente. Formula: 00000000100010100100011011011011011011011001

FLOR.— Ver fotografía.

HOJA ADULTA.— Orbicular, grande, seno peciolar superpuesto, poco pentagonal, seno lateral superior en U, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés glabro, limbo enrollado hacia el envés, lobulos enrollados hacia el envés, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, de color verde claro con poco brillo, limbo intermedio, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.— Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.— Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.— Pequeño, suelto, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.— Pequeña, tamaño regular, de color amarilla, con poca pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete poco aparente de color verde, pincel corto de color amarillo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.— Número medio de semillas por baya, ninguna. Ver fotografía.

FOLIAJE EN OTOÑO.— Amarillento con grandes zonas pardas en el haz, peciolo con líneas pardas en toda su longitud.

SARMIENTO.— 121 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 8,5 cm. de color beige amarillento con manchas, yemas cónicas.

TRONCO.— Potente.



