



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

TEMPRANO DE MORA
=====

SUMIDAD.- A. globosa, algodonosa, borde carminado. B. globosa, algodonosa, borde rojizo.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Arqueadas, haz velloso, envés algodonoso, verdes.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés algodonoso, verdes.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal elíptica, contorno con costillas, enteramente glabro, verde con alguna zona rojiza.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 000101101101101101

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, pequeña, seno peciolar en U, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, con 5 nervios, limbo plegado al haz, lobulos plegados al haz, angulo del vertice del lobulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos de color verde oscuro son brillo, limbo delgado, nervios de orden 4º no saliente. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, fino-medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Rastrero.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, suelto, pedunculo visible, agostado hasta la primera ramificación, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.


BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño algo irregular, color ambarrino claro, con poca pruina, coloración regular, forma esferoide irregular, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete poco evidente de color verde, pincel corto de color amarillento, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía. 10 % bayas apirenas.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verdes, con manchas oscuras.

SARMIENTO.- 200 cm. de largo, fuerte, muy ramificado, corteza adherente sección transversal circular, superficie con estrias, sin pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud relativa 10,3 cm. de color pardo claro, entrenudos rosaceos, yemas en dardo.

TRONCO.- Medio



SEP • 70

