



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

C H E L V A
=====

SUMIDAD.- A. media, lanosa-algodonosa, blanca con bordes carminados. B. globosa, vellosa, blanco sucio.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegadas, haz lanoso-velloso, envés algo donoso, verde muy pálido, bordes ligeramente carminados.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz glabro, envés velloso, verde.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno liso, parcialmente arañoso, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 0000001101101001100101101100

FLOR.- Ver fotografía.

HOJAS ADULTAS.- Orbicular-ovoide, mediana, seno peciolar superpuesto, pentalobulada, seno lateral superior superpuesto, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, limbo torcido, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal recto, superficie con ampollas, nervios de primer orden sobre el envés parcialmente rojos, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, de color verde oscuro con brillo, limbo algo grueso, nervios de orden 4º no salientes, Ver fotografía.

PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, con pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/6. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color ver-blanco, con pruina, coloración regular, forma fusiforme casi esferica, ombligo no persistente, muy pequeño, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor insipido, pedicelo medio, color irregular, rodete evidente, de color rojo, pincel medio de color verde, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.





FOLLAJE EN OTOÑO.- Con manchas pardas grandes y oscuras, pasando algo al envés, peciolo con zona central rojiza no uniforme.

SARMIENTO.- 130 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudo de longitud media 9,3 cm. de color amarillo a rayas rojizas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

CHELVA

B M



25 III B 20