



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

F O G O N E U
=====

SUMIDAD.— A. abierta, arañosa, borde carminado. B. media, arañosa, verde claro, dientes oscuros.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.— Extendidas, haz arañoso, envés menos, verde - con bastante tinte bronceado.

HOJAS JOVENES INFERIORES.— Extendidas, haz y envés muy poco arañoso, verde de bronceado, nervios y bordes rojos.

SARMIENTO HERBACEO.— Sección transversal circular, contorno con costillas, glabro, final arañoso, verde con muchas zonas rojas.

ZARCILLO.— Intermitente. Fórmula: 011011011011.

FLOR.— Ver fotografía.

HOJA ADULTA.— Pentagonal, mediana, seno peciolar en lira, trilobulada y alguna pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V y U, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios glabro, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro parcialmente rojos, nervios de primer orden sobre el haz rojos, dientes de lados convexos, de color verde oscuro, con brillo, limbo medio, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.— Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.— Postrada.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.— Grande, medio, pedúnculo visible, agostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.— Grande, tamaño regular, color azul oscuro, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color rosáceo, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.— Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.— Rojizo.

SARMIENTO.— 201 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente algo rajada, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, glabro, entrenudos de longitud media - 7,6 cm. de color marrón grisáceo, uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.— Potente.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	F O G O N E U
1.- SUMIDAD	A. abierta, arañosa, borde carminado. B. media, arañosa, verde claro, dientes oscuros.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés menos, verde con bastante tinte bronceado.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidad, haz y envés muy poco arañoso, verde bronceado, nervios y bordes rojos.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con costillas, glabro, final arañoso, verde con muchas zonas rojas.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 011011011011.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, mediana, seno peciolar en lira, trilobulada y alguna pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en V y U, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios glabro, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vertice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde claro parcialmente rojos, nervios de primer orden sobre el haz rojos, dientes de lados convexos, de color verde oscuro, con brillo, limbo medio, nervios de 4º orden, no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio, glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, medio, pedúnculo visible, agostado, longitud relativa 1/5. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Grande, tamaño regular, color azul oscuro, con pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo, persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color rosaceo, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Rojizo.
14.- SARMIENTO	201 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, algo rajada, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos poco salientes, glabro, entrenudos de longitud media 7,6 cm. de color marrón grisáceo, uniforme, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

12-67

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

FOGONEU



FEB • 72

