

INSTITUTO NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

G I R O

1.- SUMIDAD	A. mediana, afelpado, borde carminado. B. media, algodonoso, blanco-verde, dientes marrones.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés algodonoso, verde rojizo.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verde bronceado.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sin lenticelas, sección transversal circular, contorno con estrías, velloso, más al final, verde rojizo, algo más verde al final.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 0011001101101101101
6.- FLOR	Botón floral piriforme, mediano.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, lado de la base en arco, mediana, seno peciolar - en quilla, pentalobulado, seno lateral superior en lira algunos con diente, seno lateral inferior en U ó en lira, haz arañoso, nervios algo arañosos, envés muy arañoso, 5 nervios, -- limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes-blanquecinos, punto peciolar rojo, nervios de primer orden sobre el haz verdes con punto peciolar y zonas - rojas, dientes de lados arqueados y convexos, color verde oscuro, poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º no salientes.
8.- PECIOL DE LA HOJA ADULTA	Corto, medio, muy arañoso, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA - VEGETACION	Postrado.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Pequeño, compacto, con pedúnculo visible semiagostado.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Pequeña, tamaño regular, color de mora, con pruina, coloración irregular, forma esferoide, ombligo persistente, sección transversal regular circular, zumo incoloro, piel media, pulpa carnosa, sabor neutro, peciolo corto verde, rodete evidente verde, pincel corto verde, separación regular.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1.
13.- FOLLAJE EN -- OTOÑO	Amarillo-verdoso.
14.- SARMIENTO <i>grisaceo</i>	105, 148, 142, 150 cms. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos aplastados, enteramente liso, entrenudo de longitud media 8,3 cms. de color amarillo-grisaceo, uniforme, yemas cónicas, cordón peciolar estrecho - rectilíneo.
15.- TRONCO	Potente.


INSTITUTO NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

GIRO (PM)

T V



APR 74

