



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M A N T O N E G R O
=====

SUMIDAD.- A. media, arañosa, borde carminado. B. media, arañosa, verde, dientes oscuros.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Algo plegadas al haz, haz arañoso, envés menudas, dientes glabros, verde blanquecino, dientes bronceados.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz poco arañoso, envés glabro, verde brillante, tinte bronceado.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno con estrias finas, ligeramente arañoso, totalmente verde, totalmente.

ZARCILLO.- Intermitente. Fórmula: 0101011011011011011011011011011.

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Casi orbicular, media, seno peciolar en parentesis, penta lobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal muy obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde oscuro algo de brillo, limbo delgado, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, fino, glabro.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrada.

RACIMOS CON MADURACIÓN INDUSTRIAL.- Media, suelto, pedúnculo visible, agostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Grande, tamaño irregular, color negro-morato, con mucha pruina, coloración regular, forma ovoide, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel medio, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Verde.

SARMIENTO.- 190 cm. de largo, medio, poco ramificado, corteza adherente sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos globulosos, (abultados), totalmente glabro, entrenudos de longitud media 5,6 cm. de color amarillo rojizo, uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.- Fuerte.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	M A N T O N E G R O
1.- SUMIDAD	A. media, arañosa, borde carminado. B. media, arañosa, verde, dientes oscuros.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Algo plegadas al haz, haz arañoso, envés menos, dientes glabros, verde blanquecino, dientes bronceados.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz poco arañoso, envés glabro, verde brillante, tinte bronceado.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno con estrias, finas, ligeramente arañoso, totalmente verde, totalmente.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 0101011011011011011011011011011011011.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Casi orbicular, media, seno peciolar en ^u parentesis, pentalobulada, seno lateral superior en <u>lira</u> , seno lateral inferior en <u>lira</u> , haz glabro, envés glabro, haz y envés de 5 nervios, limbo plano, lóbulos planos, ángulo del vértice del lóbulo terminal muy obtuso, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verde amarillento, nervios de orden primera sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos, de color verde oscuro algo de brillo, limbo delgado, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, fino, glabro.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrada.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Media, suelto, pedúnculo visible, agostado hasta la 1ª ramificación, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL <i>esférica</i>	Grande, tamaño irregular, color negro-mora, con mucha pruina, coloración regular, forma <u>ovoide</u> , ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo, de color verde, rodete evidente de color verde, pincel medio, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Verde.
14.- SARMIENTO	190 cm. de largo, medio, poco ramificado, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos globulosos (abultados), totalmente glabro, entrenudos de longitud media 5,6 cm de color amarillo rojizo, uniforme, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Fuerte.

12-72

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

MANTO NEGRO



FEB • 72

