MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
MADRID

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

PANSERA

SUMIDAD.- A. Casi globosa, casi algodonosa, verde blanquecino con bordes carminados. B. media, afelpada, verde claro con bordes rojos.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verde bordes carminados.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, haz y envés arañosos, verde claro con puntos oscuros.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal cuadrangular, contorno con costillas, totalmente algo arañoso, enteramente verde claro con rayas oscuras.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 00001100010011011011011011

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Pentagonal, media, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral inferior en lira o V, haz glabro, envés arañoso, con 5 nervios, limbo plano, lobulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal recto, superficie con ampollas, casi lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden sobre el haz punto peciolar rosado, dientes de lados convexos, casi rectos de color verde no muy oscuros con poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Grande, medio, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Media, tamaño irregular, color amarillo, con poca pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor insipido, pedicelo medio de color amarillo, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación dificil. Ver fotografía.

SEMILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Amarillo con algo verde.

SARMIENTO.- 195 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal eliptica, superficie estriada, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,2 cm. de color beige-amarillo con nudos rosaceos y manchas oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.- Medio.

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06	
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA	
	P A N S E R A	

1.- SUMIDAD	A. casi globosa, casi algodonosa, verde blanquecino con bordes carminados. B. Media, afelpada, verde - claro con bordes rojos.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verde con - bordes carminados.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés velloso, verde con - puntos oscuros.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal cuadrangular, contorno con costillas, totalmente algo arañoso, enteramente verde claro con rayas oscuras.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Formula: 00001100010011011011011011
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, media, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en lira, seno lateral - inferior en lira o V, haz glabro, envés arañoso, - - con 5 nervios, limbo plano, lóbulos torcidos, angulo del vertice del lóbulo terminal recto, superfi - cie con ampollas casi lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden so - bre el haz/punto peciolar rosado, dientes de lados convexos casi rectos de color verde no muy oscuros con poco brillo, limbo grueso, nervios de orden 5º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Medio, grueso, glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Erguido.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Grande, medio, pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Media, tamaño irregular, color amarillo, con poca - pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor insipido, pedicelo medio de color amarillo, rodete evidente de color verde, pincel medio de color amarillo, separación dificil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Múmero medio de semillas por baya 2. Ver fotografía
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Amarillo con algo verde.
14.- SARMIENTO	195 cm. de largo, fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal eliptica, superficie estriada, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 9,2 cm. de color beige-amarillo con nudos rosaceos y manchas oscuras, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Medio.

/verdes

PANSERA

B V

14 36