



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPENOLOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

TINTO FINO
=====

SUMIDAD.— A. media, algodonosa, regiones bronceadas. B. media, algodonosa, blanca con algo carminado.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.— Desplegada, glabro el haz, algodonoso el envés, verde palido.

HOJAS JOVENES INFERIORES.— Extendida, arañoso el haz, velloso el envés, verde.

SARMIENTO HERBACEO.— Sección transversal circular, contorno liso, parcialmente arañoso, parcialmente alguna raya roja.

ZARCILLO.— Intermitente. Fórmula: 01000110110110110110010100

FLOR.— Ver fotografía.

HOJA ADULTA.— Pentagonal, grande, seno peciolar superpuesto, pentalobulada, seno lateral superior superpuesto, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés arañoso, con 5 nervios, limbo enrollado hacia el haz, lobulos enrollados hacia el haz, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie con ampollas, nervios de primer orden sobre el envés parcialmente rojos, nervios de primer orden sobre el haz verdes, dientes de lados convexos, de color verde oscuro sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLLO DE HOJA ADULTA.— Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.— Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.— Medio, compacto, con pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/4. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.— Media, tamaño regular, de color negro azulado, con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo coloreado, piel media, pulpa blanda, sabor neutro, pedicelo medio de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color violeta, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.— Número medio de semillas por baya 3. Ver fotografía.




FOLLAJE EN OTOÑO.— Marrón rojizo no uniforme, más en el haz, peciolo rojizo total.

SARMIENTO.— 258 cm. de largo, fuerte, muy ramificado y de gran longitud, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, sin pruina, nudos poco salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 129,5 mm., de color amarillo claro con manchas pardas, poco uniforme, yemas cónicas.

TRONCO.— Potente.

TEMPRANILLO

T V



14-74