

## MINISTERIO DE AGRICULTURA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS

## CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA

MADRID

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

## VALENCILTINTO

SUMIDAD. - A. media, acerdada, verde pálido. B. media, arañosa, regiones bronceadas.

HOJAS JOVENES SUPERIORES .- Desplegada, arañosa, regiones bronceadas.

HOJAS SOVENES INFERIORES .- Extendida, glabra, verde.

SARMIENTO HERBACEO -- Sección transversal circular, contorno liso, enteramente glabro, parcialmente con alguna raya roja.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 000000010011011011011011011011

FLOR .- Ver fotografía.

HOJAS ADULTAS. - Orbicular, pequeña, seno peciolar en lira, pentalobulada, seno lateral superior en parentesis, seno lateral inferior en v, haz glabro, envés glabro, con 5 nervios, limbo plano, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superficie lisa, ner - vios de primer orden sobre el envés verdes, nervios de primer orden - sobre el haz verdes, dientes de lados rectilineos, de color verde oscuro sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.- Largo, grueso, glabro, sección no eviden-

PORTE DE LA VEGETACION .- Postrada.

RACIMO CON MADURACION INDUSTRIAL - Grande, compacto, con pedunculo vi sible, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL. Gruesa, tamaño regular, color azul, con pruina, coloración regular, forma elipsoide, con ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de colos verde, pincel corto de color rojizo, separación dificil. Ver foto grafía.


SEMILLA .- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.


FOLLAJE EN OTOÑO. - Pardo el haz, algo pardo el envés, peciolo con alguna mancha parda.

SARMIENTO. - 280 cm. de largo, fuerte, muy ramificado y grande, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 120 mm., de color marrón rojizo con manchas oscuras, yemas redondeadas.


TRONCO .- Potente.


| Instituto Nacional                            | Centro Regional de Investigaciones Agronó-<br>micas 06   |
|---|--|
| de<br>Investigaciones                         | DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA   |
| Agronómicas                                   | VALENCIRTINTO  |
| 1 SUMIDAD                                     | A. media, acerdada, verde pálido. B. mmedia, araño sa, regiones bronceadas.  |
| 2 HOJAS JOVENES<br>SUPERIORES                 | Desplegada, arañosa, regiones bronceadas.  |
| 3 HOJAS JOVENES<br>INFERIORES                 | Extendida, glabra, verde.  |
| 4 SARMIENTO HER<br>BACEO                      | Sección transversal circular, contorno liso, ente<br>ramente glabro, parcialmente con alguna raya roja   |
| 5 ZARCILLO                                    | Intermitente. Formula: 000000010010110110110110110110110110110   |
| 6 FLOR  | Ver fotografía.  |
| 7 HOJA ADULTA                                 | Orbicular, pequeña, seno peciolar en lira, penta- lobulada, seno lateral superior en parentesis, se no lateral inferior en V, haz glabro, envés glabr con 5 nervios limbo plano, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal obtuso, superfici lisa, nervios de primer orden sobre el envés verd nervios de primer orden sobre el haz verdes, dien tes de lados rectilínios de color verde oscuro sin brillo, limbo grueso, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía. |
| 8 PECIOLO DE LA<br>HOJA ADULTA                | Largo, grueso, glabro, sección no evidente.  |
| 9 PORTE DE LA -<br>VEGETACION                 | Postrada.  |
| 10 RACIMO CÓN MA<br>DURACIÓN IN-<br>DOÚSTRIAL | tado, longitud relativa 1/3. Ver lotografia.   |
| ll BAYA CON MADU<br>REZ INDUSTRI-<br>AL       | Gruesa, tamaño regular, color azul, con pruina coloración regular forma elipsoide, con ombligo per sistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo medio, de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto de color rojizo, separación dificil. Ver fotografía.  |
| 12 SEMILLA                                    | Número medio de semillas por baya 2. Ver fotogra-<br>fía.  |
| 13 FOLLAJE EN -<br>OTOÑO                      | Pardo el haz, algo pardo el envés, peciolo con a guna mancha parda.  |
| 14 SARMIENTO                                  | 280 cm. de largo, fuerte, muy ramificado y grande corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 120 mm., de color marrón rojizo con manchas oscuras, yemas redondeadas.  |
| 15 TRONCO                                     | Potente.   |
|   |  |











## ANOTACIONES

Drouter de ledos Couveros. 12 Perulo medio