



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPЕLOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

N.º DE SALIDA

N.º DE REGISTRO

M A L V A S I A D E S I T G E S

SUMIDAD.- A. globosa, lanosa-vellosa, bordes carminados. B. media, araña-
nosa, verde pálido.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.- Desplegadas, lisas, color verde, un poco co-
brizo en el borde.

HOJAS JOVENES INFERIORES.- Extendidas, glabras, color verde pálido.

SARMIENTO HERBACEO.- Sección transversal circular, contorno liso, ente-
ramente glabro, enteramente verde.

ZARCILLO.- Intermitente. Formula: 00000101101001000000

FLOR.- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.- Orbicular, pequeña, seno peciolar en U, pentalobulada, se-
no lateral superior superpuesto, seno lateral inferior en lira, haz glа-
bro, envés glabro, limbo plano, lobulos planos, engulo del vertice del
lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre
el envés parcialmente rojizos, nervios de primer orden sobre el haz par-
cialmente rojizos, dientes de lados convexos, de color verde oscuro sin
brillo, limbo delgado, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.

PECIОLO DE LA HOJA ADULTA.- Corto, delgado, glabro, sección poco eviden-
te.

PORTE DE LA VEGETACION.- Postrado.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.- Pequeño, suelto, con pedunculo visi-
ble, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.- Pequeña, tamaño irregular, de color amari-
llo, con poca pruina, coloración irregular, forma esférica con un polo
plano, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro,
piel media, pulpa blanda, sabor insipido, pedicelos largo de color ver-
de, rodete evidente de color verde, pincelacorto de color verde, separa-
ción facil. Ver fotografía.

SEMITILLA.- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.- Tostado medio en haz y envés, tostado oscuro casi en
toda su longitud.

SARMIENTO.- 140 cm. de largo, fuerte, muy ramificado y de gran longitud,
corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada,
- parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos
de longitud media 11,35 cm., de color beige con manchas, yemas cónicas.

TRONCO.- Potente.

1.- SUMIDAD	A. glabosa, lanosa-vellosa, bordes carminados. B. media, arañosa, verde pálido.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Desplegadas, lisas, color verde, un poco cobrizo en el borde.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendidas, glabras, color verde pálido.
4.- SARMIENTO HERBACEO	Sección transversal circular, contorno liso, enteramente glabro, enteramente verde.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Formula: 00000101101001000000
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Orbicular, pequeña, sano peciolar en U, pentalobulada, seno lateral superior superpuesto, seno lateral inferior en lira, haz glabro, envés glabro, limbo plano, lobulos planos, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés parcialmente rojizos, nervios de primer orden sobre el haz parcialmente rojizos, dientes de lados convexos, de color verde oscuro sin brillo, limbo delgado, nervios de orden 4º no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, delgado, glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VEGETACION	Postrado.
10.- RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL	Pequeño, suelto, con pedunculo visible, semiagostado, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Pequeña, tamaño irregular de color amarillo, con poca pruina, coloración irregular, forma esférica con un solo plano, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel media, pulpa blanda, sabor insípido, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color verde, pinacel corto de color verde, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Tostado medio en haz y envés, tostado oscuro casi en toda su longitud.
14.- SARMIENTO	140,cm de largo, fuerte, muy ramificado y de gran longitud, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes totalmente glabro, entre nudos de longitud media 11,35 cm, de color beige con manchas, yemas cónicas.
15.- TRONCO	Potente.

ANOTACIONES

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 Racimo medio-suelto.
Color de le beyez ver-
de con prucua.

1

2

3

4


5

6

7

MALV рІА ДЕ СІТГЕС

BM



25 II A 4

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

MALVASIA DE SITGES

