



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS	CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	O H A N E S
1.- SUMIDAD	A. media, lisa, carminada. B. media, glabra, carminada.
2.- HOJAS JOVENES SUPERIORES	Desplegada, lisa, carminada.
3.- HOJAS JOVENES INFERIORES	Extendida, glabra, verde pálido.
4.- SARMIENTO HER BACEO	Sección transversal circular, contorno liso, enteramente glabro, enteramente verde.
5.- ZARCILLO	Intermitente. Fórmula: 011001100101100000000100000000.
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	Pentagonal, media, seno peciolar en v, pentalobulada, seno lateral superior en U, seno lateral inferior en v, haz glabro, envés glabro, con 5 nervios, limbo plegado, lobulo enrrrolado hacia el haz, angulo del vertice del lóbulo terminal recto, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés parcialmente rojos, nervios de primer orden sobre el haz parcialmente rojos, dientes de lados rectilíneos, de color verde fuerte sin brillo, limbo sin calificación, nervios de 4º orden no salientes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA HOJA ADULTA	Corto, grueso, glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA - VEGETACION	Erguida.
10.- RACIMO CON MA DURACION IN-- DUSTRIAL	Medio, medio, con pedúnculo visible, agostado, racimo grande. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADU REZ INDUSTRIAL	Gruesa, tamaño regular, color amarillo, con pruina coloración regular, forma elipsoide, ombligo persistente, sección transversal circular-regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa crujiente, sabor insípido, pedicelo corto de color verde, rodete evidente, de color verde, pincel corto, de color verde, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 1. Ver fotografía.
13.- SARMIENTO	170 cm. de largo, fuerte, muy ramificado y de gran longitud, corteza adherente, sección transversal circular, superficie estriada, parcialmente con pruina, nudos salientes, totalmente glabro, entrenudos de longitud media 93 mm., de color beige uniforme, yemas cónicas.
14.- TRONCO	Potente.

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

O H A N E S (Alm.)



La foto de las bayas no parece corresponderse con la variedad (Félix Cabello y Sonia García, Diciembre 2010).