



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS
CENTRO DE AMPELOGRAFIA Y VITICULTURA
M A D R I D

G A R N A C H A P E L U D A
=====

SUMIDAD.-- A. media, algodonosa, blanca con bordes verde claro, B. media, algodonosa, blanca con bordes carminados.

HOJAS JOVENES SUPERIORES.-- Extendidas, haz arafioso, envés algodonosa, ver de amarillento.

HOJAS JOVENES INFERIORES.-- En general algo plegadas hacia el haz, haz arafioso, envés vellosa, verde pálido.

SARMIENTO HERBACEO.-- Sección transversal circular, contorno con costillas, parcialmente arafioso, enteramente verde.

ZARCILLO.-- Subcontinuo. Formula: 0110011101101101101101

FLOR.-- Ver fotografía.

HOJA ADULTA.-- Pentagonal, mediana, seno peciolar casi en U abierta, penta lobulada, seno lateral superior en lira cerrada, seno lateral inferior en V, haz glabro, envés poco vellosa, con 5 nervios, limbo torcido, lóbulos torcidos, angulo del vertice del lobulo terminal agudo, superficie lisa, nervios de primer orden sobre el envés verdes amarillentos, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos de color verde fuerte con poco brillo, limbo de delgado a medio, nervios de 4º orden no salientes. Ver fotografía.

PECIOLO DE LA HOJA ADULTA.-- Corto, medio, glabro, sección poco evidente.

PORTE DE LA VEGETACION.-- Erguido.

RACIMOS CON MADURACION INDUSTRIAL.-- Pequeños, medio, pedunculo visible, herbaceo, longitud relativa 1/3. Ver fotografía.

BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL.-- Pequeña, tamaño irregular, color azul-negro con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo de color verde, rodete evidente de color verde, pincel corto de color rojo morado, separación difícil. Ver fotografía.

SEMILLA.-- Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.

FOLLAJE EN OTOÑO.-- Amarillo verdoso.

SARMIENTO.-- 213 cm. de largo, no muy fuerte, ramificado, corteza adherente, sección transversal aplastada, superficie con estrias, sin pruina, nudos poco salientes, totalmente glabros, entrenudos de longitud media 7,6 cm. de color beige amarillento, con nudos y manchas más oscuras, yemas cónicas.

TRONCO.-- Debil.

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas	Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06
	DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA
	GARNACHA PELUDA
1.- SUMIDAD	A. media, algodonosa, blanca con bordes verde claro. B. - media, algodonosa, blanca con bordes carminados.
2.- HOJAS JOVENES - SUPERIORES	Extendidas, haz arañoso, envés algodonoso, verde amari - llento.
3.- HOJAS JOVENES - INFERIORES	En general algo plegadas hacia el haz, haz arañoso, envés vellosa, verde pálido.
4.- SARMIENTO HERBA CEO	Sección transversal circular, contorno con costillas, par - cialmente arañoso, enteramente verde.
5.- ZARCILLO	Subcontinuo. Fórmula: 0110011101101101101101
6.- FLOR	Ver fotografía.
7.- HOJA ADULTA	^{cuneiforme} Pentagonal , mediana, seno peciolar ^{parentes} casi en U abierta, pen - talobulada, seno lateral superior en lira cerrada, seno - lateral inferior en V, haz glabro, envés poco vellosa con 5 nervios, limbo torcido, lóbulos torcidos, ángulo del - vértice del lóbulo terminal agudo, superficie lisa, ner - vios de primer orden sobre el envés verdes amarillentos, nervios de primer orden sobre el haz verde claro, dientes de lados convexos de color verde fuerte con poco brillo, limbo de delgado a medio, nervios de 4º orden no salien - tes. Ver fotografía.
8.- PECIOLO DE LA - HOJA ADULTA	Corto, medio, glabro, sección poco evidente.
9.- PORTE DE LA VE - GETACION	Erguido.
10.- RACIMOS CON MADU RACION INDUSTRIAL	Pequeños, medio, pedúnculo visible, herbáceo, longitud re - lativa 1/3. Ver fotografía.
11.- BAYA CON MADUREZ INDUSTRIAL	Pequeña, tamaño irregular, color azul-negro, con pruina, coloración regular, forma esférica, ombligo persistente, sección transversal regular, zumo incoloro, piel gruesa, pulpa jugosa, sabor neutro, pedicelo largo de color ver - de, rodete evidente de color verde, pincel corto de color rojo morado, separación difícil. Ver fotografía.
12.- SEMILLA	Número medio de semillas por baya 2. Ver fotografía.
13.- FOLLAJE EN OTOÑO	Amarillo verdoso.
14.- SARMIENTO	213 cm. de largo, no muy fuerte, ramificado, corteza adhe - rente, sección transversal aplastada, superficie con es - trias, sin pruina, nudos poco salientes, totalmente gla - bros, entrenudos de longitud media 7,6 cm. de color beige amarillento, con nudos y manchas más oscuras, yemas cóni - cas.
15.- TRONCO	Débil.

18-19

Instituto Nacional
de
Investigaciones
Agronómicas

Centro Regional de Investigaciones Agronómicas 06

DEPARTAMENTO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA

GARNACHA PELUDA



MAY • 71

