

# 2020

Mariposa del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN						
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					

# Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HUEVO												
ORUGA												
CRISÁLIDA												
IMAGO												



PARQUE REGIONAL DEL SURESTE Y RESERVA NATURAL EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA

Mariposas diurnas



## ¿Sabías qué?

Los imagos de esta mariposa vuelan en los meses más cálidos del año y a menudo se posan debajo de los arbustos para aprovechar su sombra y escapar al calor sofocante de la canícula. Esta especie fue descrita por el entomólogo francés Henri Vallantin en 1894.

## ¿Cuáles son sus plantas nutricias?

Las orugas del denominado *lobito jaspeado* se alimentan de diversas gramíneas, entre las que destacan el fenal, *Brachypodium phoenicoides*, y el cervero, *Brachypodium retusum*. También vive, entre otras, en *Poa*, *Festuca*, *Aira* y *Deschampsia*.

## ¿Cómo es?

*Pyronia cecilia* presenta una generación anual; en el este y sur de Madrid los adultos comienzan a verse en vuelo a finales de mayo y permanecen en el campo hasta septiembre, con una abundancia máxima en julio. Muy parecida a su congénere *Pyronia tithonus*. Su anverso es anaranjado con el borde castaño; en la parte posterior de la celda de las alas anteriores, los machos tienen una mancha oscura (androconia) en forma de cuadrilátero, normalmente fragmentada por las venas anaranjadas que la diferencia de la especie mentada; ocelo apical oscuro, con dos pupilas en las alas anteriores en ambos sexos. El reverso es de color ocre claro, con borde castaño, liso en las alas anteriores, jaspeado de gris-naranja en las posteriores, y carecen de ocelos. En las hembras, en comparación con *Pyronia tithonus*, faltan los ocelos en el anverso de las alas posteriores.

## ¿Dónde podemos encontrarla?

Esta mariposa, que pertenece a la familia Satyridae, habita en el norte de África, sur de Europa y Asia Menor. Vive en casi toda la península ibérica, faltando solo en gran parte de la cornisa cantábrica. Todo el Parque Regional del Sureste y en la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola.

## ¿Cuál es su hábitat?

En el este y sur de Madrid es abundante, en particular en barbechos, bordes de camino y cultivos de secano, así como en espartales, fenalares y romerales. Aparece también en áreas húmedas y, aunque está presente, es más escasa en encinares y coscojares. Como sucede en muchos otros satíridos, las hembras aparecen después que los machos, de modo que escasean en mayo y junio y son más frecuentes en agosto y en septiembre.

## ¿Grado de protección?

Sin protección. Como se ha indicado, tiene un amplio espectro ecológico; está muy extendida en la Comunidad de Madrid, donde abunda y no existen factores de riesgo para su supervivencia.

