

Barbo comiza

Barbus comiza
(Steindachner 1864)

Fam CYPRINIDAE



Barbo común

Barbus bocagei
(Steindachner 1864)

Fam CYPRINIDAE



• Descripción:

- Cuerpo: Fusiforme (no aplanado lateralmente), bastante alargado, casi cilíndrico, dorso algo curvado y algo aplanado, en su parte ventral musculoso y cabeza robusta. Gran mucosidad. Línea lateral casi recta.
- Aleta dorsal alta y corta con 11 o 12 radios y caudal muy escotada. Aletas inferiores grisáceas, las inferiores algo rosáceas en el común.
- Boca muy peculiar: Ínfera (ojos y boca hacia abajo) y subterminal. Labios carnosos formando un hocico apuntado, adaptado para rebuscar bajo las piedras. Con 2 pares de barbillones (bigotes que le salen del labio superior). Tamaño muy variable (hasta 30-60 cm) (200-500 gr hasta 5 kg).
- Color: Muy variable, verdoso-pardo, vientre más amarillento. De jóvenes el cuerpo con manchas o punteaduras no simétricas oscuras.

COMIZA

Mayor tamaño.

Cabeza: corta > 1/4 parte del cuerpo

Cóncava y estrecha.

Hocicudo.

Barbillones cortos (no llegan a la altura del ojo).

Línea dorsal media:

48 a 52 escamas



COMUN

< 1/4 parte del cuerpo.

Convexa y redondeada.

Barbillones largos (sobrepasan el ojo).

46 a 51 escamas.

• Habitat:

- Tramo medio-bajo. Adaptado a corrientes (fortaleza de cuerpo y aletas).
- Carácter gregario (cardúmenes) y crepuscular.
- Viven en fondos arenosos o pedregosos de aguas claras, tranquilas, oxigenadas y puras. En esta época los machos presentan "tubérculos nupciales" por el cuerpo.

• Reproducción:

- Maduros sexualmente desde los 3 años los machos y 4 las hembras.
- Poco migratorio sólo se mueven en el desove cuando "suben" a frezar en busca de aguas más rápidas y menos profundas hasta contactar con truchas (mayo-junio-julio).





— Una hembra media pone sobre las piedras y grava del lecho unos 7.000 huevos que eclosionan a los 10-15 días.

• Alimentación:

— Bastante omnívoro. Rebusca los fondos en busca de alimentos pegados a las piedras: gusanos, moluscos, insectos, larvas acuáticas, huevos de otros peces. También pequeñas hojas y raíces de plantas acuáticas. Más carnívoro el comizo.

• Distribución geográfica:

— *Barbo común*: Endémico de la Península, propio de Duero y Tajo. Muy repartido: Jarama, Tajo, Guadalix, Lozoya, Manzanares, Tajuña y Alberche.
— *Barbo comiza*: Cuencas de Jarama y Tajo.

• Pesca y Protección:

— *Barbo común*: PESCABLE 12 ejemplares y 18 cm dimensión mínima. Entra muy bien a la lombriz de tierra. Aunque pica con asticot, quesos, etc. Ver cebos prohibidos según legislación vigente en cada comunidad autónoma. Anejo III C Berna 82/72 y Anejo V Directiva Habitat 1992.
— *Barbo comiza*: NO OBJETO DE PESCA. Anejo III C Berna 82/72 y Anejo II y V Directiva Habitat 1992.
No amenazada según Libro Rojo de Vertebrados de España.
En MADRID en PELIGRO DE EXTINCIÓN (CREA 1992).

• Otras cosas:

— Sus huevas son tóxicas (pueden provocar trastornos intestinales).



Barbo común

