

Bermejuela

Rutilus arcasii
Chondristoma arcasii Steindachner 1866)

Fam CYPRINIDAE



rínidos



• Descripción:

- Cuerpo: Fusiforme y alargado.
Marcada diferencia entre el dorso más oscuro y el vientre más claro. Línea dorsal media con menos de 50 escamas (más grande y *menos número que en la pardilla o boga*).
- Cabeza Convexa (perfil chato).
Boca subterminal, sin barbillones, que no llega al comienzo del ojo.
Parecido al cacho, con axilas o articulaciones de aletas tonos rojizos.
- Aleta dorsal corta, algo convexa y con radios ramificados.
Inserción a la altura de la ventral.
- Alcanza 10-12-15 cm. Max de 19-20 cm y vive hasta 5-6 años.

• Habitat:

- Tramo medio-alto (entre la trucha y el barbo), de aguas claras y oxigenadas de ríos de no mucho caudal ni profundidad y en embalses.

• Reproducción:

- Freza a final de la primavera (abril-junio) en lechos arenosos y vegetación de orilla, donde deposita de 500 a 5.000 huevos. Madura a los 2 años.

• Alimentación:

- Dentritívoro restos de animales y vegetales.
- Vegetales y larvas y macroinvertebrados.

• Distribución geográfica:

- Endémica de la Península Ibérica (Duero, Tajo, Ebro, Guadiana).
- Localizada en la mitad norte de la Península.
- En Madrid, en el Lozoya, Jarama, Guadarrama, Guadalix y Alberche.

• Protección:

- Anejo III C Berna 82/72 y Anejo II Directiva Habitat 1992.

