

## CULTIVOS DE SECANO

### 1. Cereales de otoño invierno (Trigo, Cebada, Avena y Centeno)

Se evitará en lo posible, considerando las condiciones climáticas coincidentes con los primeros estadios de estos cultivos, el abonado nitrogenado en la sementera; efectuándose en cobertera en los momentos de máxima necesidad, principalmente durante el ahijado, encañado, la fase de diferenciación de las inflorescencias y el espigado.

De acuerdo con la forma de nitrógeno en el abono:

- Nítrico: En el encañado y en el espigado.
- Amoniacal: En el ahijado.
- Nítrico y amoniacal: En el encañado.
- Ureico: en el ahijado.

El sembrar leguminosas antes del cereal, deja en el suelo nitrógeno atmosférico fijado por la planta, que puede servir de aporte nitrogenado precoz para el cultivo siguiente.

### 2. Veza forrajera y leguminosas grano

Amoniacal: Antes de la siembra.

### 3. Girasol

N amoniacal, ureico: Aconsejable enterrar el abono antes de la siembra mediante una labor. N nítrico, nítrico-amoniacal, ureico: En cobertura, siempre que la humedad lo permita.

### 4. Viñedo

Amoniacal: Quince días antes del inicio de la brotación.

### 5. Olivar

Nítrico y Amoniacal: Antes de la diferenciación de las yemas..