



Comunidad  
de Madrid

# Escenarios de vacunación COVID-19

## Recomendaciones para mayores de 12 años\*

### CASO 1 Sin haber pasado COVID-19



#### Tiempo mínimo de espera entre la 1ª y la 2ª dosis

<b>Pfizer</b>	21 días
<b>Moderna</b>	28 días
<b>AstraZeneca</b>	10-12 semanas
<b>Janssen</b>	No hay 2ª dosis

#### Tiempo de espera entre la 2ª y la dosis de refuerzo

<b>Pfizer</b>	5 meses
<b>Moderna</b>	5 meses
<b>AstraZeneca</b>	3 meses
<b>AstraZeneca</b> (combinada)	5 meses
<b>Janssen</b>	3 meses tras la 1ª dosis

### CASO 2 Infección por COVID-19 antes de recibir la 1ª dosis



#### Tiempo de espera entre la infección y la 1ª dosis

**4 semanas tras la infección,  
siempre que esté recuperado.**

#### Tiempo de espera entre la 1ª y la dosis de refuerzo

<b>Pfizer</b>	5 meses
<b>Moderna</b>	5 meses
<b>AstraZeneca</b>	3 meses
<b>Janssen</b>	3 meses

**Nota:** Las personas que han precisado solo una dosis al contar con infección previa a la vacunación, podrán recibir una segunda dosis cuando lo requieran.

### CASO 3 Infección por COVID-19 antes de recibir la 2ª dosis



#### Tiempo de espera entre la infección y la 2ª dosis

**Pfizer** 4 semanas tras la infección  
si está recuperado

**Moderna** 4 semanas tras la infección  
si está recuperado

**AstraZeneca** 4 semanas tras la infección  
si está recuperado, respetando  
10-12 semanas desde la 1ª dosis

**Janssen** No hay 2ª dosis

#### Tiempo de espera entre la 2ª y la dosis de refuerzo

<b>Pfizer</b>	5 meses
<b>Moderna</b>	5 meses
<b>AstraZeneca</b>	3 meses
<b>AstraZeneca</b> (combinada)	5 meses
<b>Janssen</b>	3 meses tras la 1ª dosis

### CASO 4 Infección por COVID-19 después de recibir la 2ª dosis



#### Tiempo mínimo de espera entre la infección y la dosis de refuerzo

**28 días tras la infección,  
siempre que esté recuperado.**

**Tiempo recomendable:**

**5 meses**  
tras superar la infección

\* En las personas entre 12 y 17 años no se recomienda, de momento, dosis de refuerzo