

PLAN DE VACUNACIÓN. DEL 18 al 24 DE OCTUBRE

Las vacunas se administran en función de su disponibilidad. Actualizado a 18 de octubre

GRUPO	DÓNDE ME VACUNAN	CÓMO ME CITAN	QUÉ VACUNA
PRIMERAS DOSIS			
12 años y más¹ Nacidos en el año 2009 y anteriores que no hayan recibido ninguna dosis.	Hospital Enfermera Isabel Zandal, Hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Wizink Center.	Autocita , mediante aplicación móvil o web . Sin cita previa consulte la web .	Vacuna adecuada según edad y disponibilidad.
SEGUNDAS DOSIS			
Todos los grupos de edad que hayan recibido ya la primera dosis²	Hospitales del Servicio Madrileño de Salud, Hospital Enfermera Isabel Zandal, Wizink Center.	Citación mediante un SMS³ con un enlace para confirmar la cita en una página web habilitada al efecto. Sin cita previa consulte la web .	La misma vacuna que en primera dosis.
COLECTIVOS ESPECÍFICOS			
PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS. TERCERA DOSIS ADICIONAL	En sus centros residenciales.	Por los mismos equipos que en dosis anteriores.	La que se puso en dosis anteriores.
PERSONAS EN SITUACIÓN GRAVE DE INMUNOSUPRESIÓN. TERCERA DOSIS ADICIONAL ver PDF	Hospitales en los que se esté siguiendo su proceso.	Citados por sus Servicios Clínicos de referencia.	La que se puso en dosis anteriores.
GRUPOS DE RIESGO⁵ TERCERA DOSIS ADICIONAL	Hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Varios hospitales privados.	Citados directamente desde los centros hospitalarios en los que son atendidos habitualmente.	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
MUJERES EMBARAZADAS	Centro de Vacunación más cercano al que se le derive.	Citadas directamente al acudir al profesional sanitario que realice el seguimiento del embarazo.	Vacuna ARNm (Pfizer o Moderna)
COLECTIVOS CON DIFICULTADES PARA ACCEDER A LA VACUNA	Diversos centros de vacunación: Ver PDF: Español Francés Inglés Árabe Chino	No se requiere cita previa.	Vacuna Janssen o la adecuada a su edad y condición.
ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO	Campus universidades públicas y privadas: ver PDF	No se requiere cita previa	Pfizer / Moderna o la adecuada a edad y condición
COLECTIVOS ESENCIALES⁴: Segundas dosis: menores de 55 años que recibieron primera dosis AstraZeneca.	Diversos centros de vacunación.	Recibirán la citación mediante un SMS interactivo que les permitirá elegir entre AstraZeneca o Pfizer . Podrá cambiar de opción en el punto de vacunación	Vacuna ARNm (Pfizer) o vacuna AstraZeneca.
GRANDES DEPENDIENTES - Grado III Ley 39/2006, de 14 de diciembre) con necesidad de intensas medidas de apoyo, no institucionalizados.	- En su domicilio o Centro de Salud. - En sus Centros de Día .	Citados desde sus Centros de Salud o Centros de Día.	Vacunas ARNm o Janssen.

Los **mutualistas (MUFACE, MUGEJU, ISFAS y otros)** se vacunan y se citan o autocitan con su grupo de edad o condición, con la vacuna adecuada según edad y disponibilidad.

PLAN DE VACUNACIÓN. DEL 18 al 24 DE OCTUBRE

¹ Las personas menores de 16 años deben ir acompañados de su padre, madre, tutor legal o persona autorizada por los mismos, a los que se les podrá solicitar documentación acreditativa de su relación (DNI, pasaporte o libro de familia...) o del estado de salud del menor. ([Descargar autorización](#)).

² Las personas menores de 66 años que pasaron COVID-19 antes de recibir la primera dosis no serán citadas, por considerarse perfectamente inmunizadas. Existe algún grupo de personas que, a pesar de tener esa edad, recibirá dos dosis ([ver más información](#)).

³ Las personas que son citadas por SMS, en el caso de que el usuario no confirme su cita a través de la opción habilitada para ello, recibirá una llamada telefónica desde el número de teléfono **91 502 60 58** para ratificar el día y la hora en que se le ha citado (**este número NO es para consultar dudas**).

⁴ Docentes, personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas y otros profesionales sociosanitarios

⁵ Se consideran **grupos de alto riesgo** según la última actualización de la estrategia nacional de vacunación del Ministerio de Sanidad e incluyen a pacientes:

- Trasplantados o en listas de espera para serlo.
- En hemodiálisis y diálisis peritoneal.
- Con enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica.
- Con inmunodeficiencias primarias e infección con el VIH con menos de 200 cél/ml a pesar de TAR eficaz y carga viral indetectable.
- Con síndrome de Down mayores de 40 años.
- Con Fibrosis Quística.