



INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN CON JANSSEN

La vacunación frente a la COVID-19 constituye actualmente **una medida clave** para superar la pandemia que estamos sufriendo.

La vacuna frente a la COVID-19 protege de desarrollar un cuadro grave en caso de enfermar.

En general, la **pauta de vacunación completa** con la vacuna de Janssen es **de una única dosis**.

La **máxima protección** no se alcanza hasta que no hayan pasado **14 días después** de la administración de la dosis.

Es posible que pueda sufrir algunos **efectos secundarios** tales como inflamación, picor y/o dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, náuseas y fiebre, todos ellos generalmente de intensidad leve o moderada y **que se resuelven pasados dos o tres días**. Estas reacciones son menos intensas y frecuentes a mayor edad de los vacunados. **Se puede utilizar una dosis de paracetamol cada 6 horas durante las primeras 24 horas** después de la vacunación para reducir estos efectos secundarios.

Por último, no olvide que las personas vacunadas **DEBEN CONTINUAR ADOPTANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS** para reducir la transmisión (USO DE MASCARILLA, VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS, DISTANCIA INTERPERSONAL Y LAVADO DE MANOS) pues ninguna vacuna **protege al 100%**.