

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN CON NUVAXOVID® (Vacuna de Novavax)

La **vacunación frente a la COVID-19** constituye actualmente **una medida clave** para superar la pandemia que estamos sufriendo.

La **vacuna frente a la COVID-19 protege de desarrollar un cuadro grave en caso de enfermar.**

En general, la **pauta de vacunación completa** con la vacuna de Nuvaxovid®/ Novavax es de **dos dosis**. El tiempo que debe transcurrir entre la primera y la segunda dosis es de al menos 3 semanas. **La máxima protección no se alcanza hasta que no hayan pasado 7 días después de la segunda dosis.**

Si usted ha tenido un diagnóstico de haber padecido la infección por el coronavirus (con o sin síntomas) y tiene **65 o menos años**, se recomienda que **solo reciba una dosis de esta vacuna.**

Es posible que pueda sufrir algunos **efectos secundarios** tales como sensibilidad y/o dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, malestar general, artralgias, náuseas o vómitos, todos ellos generalmente de intensidad leve o moderada y **que se resuelven pasados dos o tres días**. Suelen ser más frecuentes después de la segunda dosis. Estas reacciones son menos intensas y frecuentes a mayor edad de los vacunados. Se puede utilizar una dosis de paracetamol cada 6 horas durante las primeras 24 horas después de la vacunación para reducir estos efectos secundarios.

Por último, no olvide que las personas vacunadas DEBEN CONTINUAR ADOPTANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS que se indiquen en cada momento para reducir la transmisión pues ninguna vacuna protege al 100%.

Puede consultar las siguientes páginas web para más información sobre las medidas preventivas y sobre la vacunación frente a la COVID-19:

- <https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus>
- <https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid>