



15.12.2021

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN CON PFIZER PARA POBLACIÓN PEDIATRICA ENTRE 5-11 AÑOS (ARNm) (Comirnaty 10 microgramos/dosis)

La vacunación de la población de este grupo de edad **reducirá** el número de casos de COVID-19 en niños y niñas de estas edades y **evitará que los niños y niñas con mayor riesgo enfermen gravemente si contraen la COVID-19.**

La **pauta de vacunación** completa con esta vacuna de Pfizer (Comirnaty 10 microgramos/dosis) es de dos dosis. La segunda dosis se administrará, como mínimo, **a las 8 semanas después de la primera**, pudiéndose superar este intervalo de tiempo sin perder eficacia. La **máxima protección** no se alcanza hasta **pasados 7 días después de la segunda dosis**.

La vacuna de la COVID-19 Comirnaty (basada en ARNm) 10 µg/dosis ha demostrado que es **muy segura**. Como todas las vacunas, tras su administración, su hijo/a puede sufrir **algunos efectos secundarios, la mayoría son leves y de corta duración (uno o dos días)**. Los efectos secundarios más comunes son dolor, enrojecimiento y sensación de pesadez en el hombro y el brazo del pinchazo, sensación de cansancio, malestar general y escalofríos, dolor de cabeza y fiebre de bajo grado.

Si los síntomas lo requieren se puede tomar **paracetamol** (dosis según peso) y, si es necesario, repetir a las 6-8 horas. No es necesario tomar este u otro medicamento antes de la vacunación.

Por último, no olvide que **los niños y niñas vacunados, al igual que los adultos, deben continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión** (uso de mascarilla, recomendado a partir de los 3 años, ventilación de espacios cerrados, distancia interpersonal y lavado de manos) pues ninguna vacuna protege al 100%.