

**Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin**



© Miguel Ángel Ribes

**Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin**



© Miguel Ángel Ribes

**Tricholoma portentosum (Fr.) QuéL.**



© Miguel Ángel Ribes

Capuchina, seta de charol

	<b>Tricholoma sciodes</b>	<b>Tricholoma portentosum</b>
<b>Sombrero</b>	Frecuentemente cónico en la juventud, con mamelón más o menos agudo, apenas viscoso en tiempo húmedo, siempre sin tonos amarillentos	Acampanado a convexo en la juventud, con mamelón más o menos ancho, viscoso en tiempo húmedo, a veces con tonos amarillentos en las zonas poco pigmentadas
<b>Pie</b>	Blanco, con tonos grisáceos	Blanco, con tonos amarillentos
<b>Láminas</b>	Blanco grisáceas a grises, con el margen punteado de negro	Blanco amarillentas, a veces algo rosadas o grisáceas en la madurez, margen no punteado de negro
<b>Sabor</b>	Desagradable, algo amargo	Agradable, harinoso
<b>Hábitat</b>	Típico de hayedos ( <i>Fagus</i> ), a veces bajo coníferas ( <i>Pinus</i> )	Típico de bosques de coníferas, sobre todo <i>Pinus sylvestris</i> , raro bajo planifolios ( <i>Quercus</i> , <i>Fagus</i> )
<b>Observaciones</b>	Extremar las precauciones con cuerpos fructíferos de <i>T. portentosum</i> muy jóvenes (por falta de desarrollo en forma y coloración) o muy viejos (por la coloración grisácea que pueden adoptar las láminas). Es posible confundir <i>T. sciodes</i> con muchos otros <i>Tricholoma</i> grises, ej., grupo de <i>T. terreum</i> y <i>T. scalpturatum</i> , algo más pequeños y escamosos, mamelón ancho y frágiles, y grupo de <i>T. atosquamosum</i> y <i>T. squarrulosum</i> , de sombrero escamoso lanoso y pie a menudo ensanchado en la base (en <i>T. squarrulosum</i> escamoso y oscuro).	