

***Clitocybe nebularis* (Batsch) P. Kumm.**



Pardilla

© Javier Marcos

***Infundibulicybe geotropa* (Bull.) Harmaja**
(≡ *Clitocybe geotropa* (Bull.) Quéél.)



© Javier Marcos

Cabeza de fraile, platera

***Entoloma sinuatum* (Bull.) P. Kumm. (= *E. lividum* Quéél.)**



Seta engañosa, pérfrida

© Nino Santamaría

	<i>Clitocybe nebularis</i>	<i>Entoloma sinuatum</i>	<i>Infundibulicybe geotropa</i>
Sombrero	Coloraciones grisáceas sin matices amarillentos	Coloraciones crema pálido a crema amarillento	Mate, de color crema pálido a ocre rojizo
Láminas	Decurrentes, crema amarillentas, fácilmente separables de la carne	Escotadas, crema amarillentas, que en la madurez se vuelven rosadas, no separables	Marcadamente decurrentes
Esporada	Crema amarillento en masa	Rosa en masa	Crema pálido en masa
Olor	Fuerte y muy característico	Olor harinoso intenso	Ciánico, como de almendras amargas
Observaciones	<i>Clitocybe nebularis</i> es ampliamente recolectada y consumida en muchas regiones (País Vasco, Navarra, Castilla y León), sin embargo es causante de intolerancias digestivas en muchas personas, incluso bien cocinada, por lo que no debe consumirse y está prohibida su comercialización. <i>Entoloma sinuatum</i> es, por el contrario, una seta muy tóxica que causa un síndrome gastrointestinal agudo. Ambas especies podrían confundirse con <i>Infundibulicybe geotropa</i> , buen comestible y comercializable.		